

おなかが痛い

救急医療体制

小児科医の
かかり方

小児科医情報

お薬の飲み方

熱が出た

下痢をした

吐いた

おなかが痛い

せきが出る

発疹が出た



- 泣きやまない、またはくり返し泣く
- だんだん痛みがひどくなる
- おなかが硬く、はっている
- 押すと痛みが激しくなる
- 便に血が混じっている
- 排便しても痛みが軽くない
- おなかをぶつけた後から痛くなった
- 陰のうや股の付け根がはれている
- くり返し吐く
- 茶色や緑色のものを吐いた



1つでも
「はい」がある

すぐに医療機関を
受診してください

1つも
「はい」がない

翌日の朝など、
かかりつけ医に
診てもらってください

おなかをぶつけた後で痛みが強くなってきた場合は、直ちに外科系医療機関を受診してください。

アドバイス



- おなかを触って痛むところを確かめましょう。
- おなかを締めつける衣服はやめましょう。
- 痛み方の様子、息の臭さを観察しましょう。
- 排便で治ることがあります。トイレへ行かせてみましょう。
- 3～4日以上排便がなければ浣腸してみましょう。
- 食事は吐き気に注意して、塩分、糖分を含んだ飲み物を少しずつ与えましょう。
- 食べ過ぎや風邪のときは、おなかを温めてみましょう。

